

POUR L'EXAMEN

Il faut être à jeun strictement (sans boire ni manger ni fumer) durant les six heures précédant l'examen. Malgré cette précaution, il peut arriver que l'estomac soit encore plein et le radiologue pourra alors décider soit d'annuler l'examen soit de mettre une sonde dans l'estomac pour aspirer le liquide.

APRÈS L'EXAMEN

Vous pourrez vous nourrir normalement.

DÈS VOTRE RETOUR À LA MAISON

Si besoin, reprenez contact avec nous.

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l'examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N'hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.

Madame, Monsieur
a personnellement rempli cette fiche le
et donné son accord pour que l'examen soit réalisé.
Signature:







VOUS ALLEZ AVOIR UN TRANSIT ŒSOGASTRODUODÉNAL

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Une information vous est fournie sur le déroulement de l'examen et de ses suites.

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cet examen qui doit répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d'imagerie.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

I F SCANNER ET LA RADIOGRAPHIE UTILISENT DES RAYONS X

En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. À titre d'exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l'exposition moyenne naturelle (soleil) subie lors d'un voyage de 4 heures en avion.

Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

L'IRM ET L'ÉCHOGRAPHIE N'UTILISENT PAS DE RAYONS X

Ce sont des examens non irradiants qui utilisent soit les propriétés des champs magnétiques pour l'IRM, soit les propriétés des ultrasons pour l'échographie.

Pour les intensités utilisées par ces deux techniques, il n'a jamais été décrit de conséquence particulière pour l'homme.

DE OUOI S'AGIT-IL?

Le transit œsogastroduodénal est une exploration qui sert à mettre en évidence des lésions de l'œsophage, de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin grêle.

Elle est utile à votre médecin pour déterminer l'origine de vos symptômes.

POUROUOI CHOISIR LE TRANSIT ŒSOGASTRODUODÉNAL?

Cet examen est complémentaire de la fibroscopie œso-gastrique pour mettre en évidence d'éventuelles lésions ou pour contrôler les résultats d'une intervention chirurgicale.

LE DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

Un produit à base d'iode, opaque aux rayons X, sera utilisé et administré par la bouche (sulfate de baryum ou produit de contraste hydrosoluble). Ces agents de contraste permettent de repérer le tube digestif supérieur lors des radiographies par rayons X.

Pendant l'examen, vous serez tantôt debout, tantôt allongé sur la table d'examen selon la région étudiée. C'est un examen rapide qui n'est pas fatigant. La durée de l'examen est d'environ 15 minutes.

OUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR PENDANT L'EXAMEN?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétences et de sécurité maximales, comporte un risque de complication.

Les complications du transit œsogastroduodénal sont exceptionnelles :

- Réaction allergique au produit de contraste absorbé
- Fausses routes qui traduisent le passage du produit de contraste dans les voies aériennes supérieures qui peut être responsable de symptômes respiratoires ;
- Passage du produit de contraste à travers la paroi du tube digestif en cas de perforation.

Dans des cas très exceptionnels, ces complications peuvent être sérieuses.



CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

<u>Avant l'examen, répondez attentivement aux questions suivantes :</u>

Avez-vous déjà subi une intervention abdominale ?	Avez-vous eu récemment une radiographie de l'estomac,		
Avez-vous été traité par des rayons sur l'abdomen ? Oui Onor Êtes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitez-vous ? Oui Onor D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait	de l'intestin ou du côlon ?	🗆 oui	□non
Êtes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitez-vous ? □ oui □ nor D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait	Avez-vous déjà subi une intervention abdominale ?	🗆 oui	□non
D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait	Avez-vous été traité par des rayons sur l'abdomen ?	🗆 oui	□non
	Êtes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitez-vous ?	🗆 oui	□non
		paraîtra	